

broedkolonies van kok- en zilvermeeuwen en visdiefjes. Bij laag water dwarst hij aan het hoofd van de groep omzichtig de brede zandplaten om helemaal tegen de Schelde aan in het n. de honderden nesten te bereiken. De tocht is veel-eisend. Twee uur stappen, springen en ploeteren. Men moet lichamelijk fit zijn en voorzien van gummilaarzen en een reeds buiten gebruik gestelde broek. Van de zestig enthoesiaste vertrekkers der bibliotheeca Wasiana te St.-Niklaas zijn er verleden jaar amper een tiental bij de broedkolonies geraakt. Maar voor de sterken en de moedigen is de beloning subliem : terwijl meer dan tienduizend meeuwen krijsend en lachend een witgrijze wolk van vleugels boven het hoofd vormen, ziet men in de soms drijvende nesten hoe een kuikentje nog zijn witte piktaand bezit, hoe in een ander nest het ei openbreekt en in nog een ander twee, drie jonge leventjes met opengesperde bek aan een der grote wetten van de natuur gehoorzamen : het voortbestaan. Leven !

Op de scherpe, onbegroeide kanten der kreekjes ziet men de scholekster, verraden door haar oranje-rode snavel, zittend op haar nest.

Op terugtocht voelt men zich lichamelijk vermoeid maar geestelijk zo voldaan en rijk. Het is alsof de Schepper zijn vinger even tegen de onze gedrukt heeft zoals op het fresco van Michelangelo ! Hier en daar schieten nog gorzen uit het riet en hoort men karekiet en snor, maar men droomt en is niet meer in staat tot scherpe waarnemingen...

Mochten de 4000 ha. schor van Saaftinge nog lang in deze ongerepte toestand blijven bestaan tot groot genot en nut van de ornitologen uit alle landen van Europa, die hier regelmatig studiereizen ondernemen.

Moge de kordate kommandant Van der Zande uit Clinge — Ned. Saaftinge nog lang onder zijn vaderlijke bescherming houden ! Hij maakt in ieder geval afspraak met « De Wielewaal » op 26 mei a.s. !

## Avifauna van de Spuikom

door M.R. Hautekiet.

7687

### I. Het milieu.

En stenen gevel versiert ons huis. Wie aan onze Belgische kust aan vogelstudie wil doen, wordt van jaar tot jaar een minder te benijden man. Zeldzaam zijn immers de oorden waar de stenen gevel nog uitzicht laat op een ongerept stukje natuur.

De Spuikom, nagenoeg cirkelvormig en met verzorgde glooiing, is haast geheel door woonwijken omgeven. Zij ligt onmiddellijk ten zuiden van de Oostendse haven als een bijna onoverzichtelijk wa-

tereservoir van 84 ha. In januari 1902 is men met het graven van dit kunstmatig meer begonnen en eerst na veel jaren had men de geplande diepte van 4 meter beneden het laagwaterpeil bereikt. Nu hoopte men dat de druk van het zeewater sterk genoeg zou zijn om het vele overtollige zand uit de haven in het kunstmatig meer te stuwen. Dit bleek echter reeds bij de eerste poging een ijdele hoop en er mag gezegd worden, dat de Spuikom nooit het bestemde doel heeft gediend. Zo komt het ook dat de slijk-rige maar dure baggermolen nog heden

ten dage een vertrouwd beeld vormt in de haven van Oostende.

Intussen — en dit is belangrijk voor de avifauna waar wij het zo dadelijk over hebben — is de gemiddelde diepte verminderd tot  $\pm 1,30$  meter. Aangezien er door middel van sluizen een rechtstreekse verbinding bestaat met de havengeul is het water zout. De beperkte, afgesloten oppervlakte en de geringe diepte zijn twee factoren die de hoge temperatuur van het water en aldus de verdamping in de hand werken. Daardoor ligt het zoutgehalte van het water hoger dan op de Noordzee.

Er zijn mossel- en oestercultures en er is een rijke bodembegroeiing, er zijn een aantal overwegend kleinere vissoorten, er zijn kreeftachtigen, schelpdieren en waterinsekten, zodat de pleisterende vogels er een keuze van zowel dierlijk als plantaardig voedsel aantreffen. Tweemaal per jaar tenslotte wordt de Spuikom voor een paar dagen drooggelegd. Voor het overige is er alleen water, als we tenminste het enkel schiereilandje van slechts weinige vierkante meters grootte niet meetellen: daar liggen een paar schuitjes gemeerd en er komt zelfs een brakwaterpoeltje voor.

## II. De vogels.

Ofschoon vrijwel geheel door woonwijken omringd, komen er vogels op de Spuikom; vanzelfsprekend zijn dat alleen vogels die het van het water moeten hebben. En aangezien het ene schiereilandje zo miniem is, kan er zelfs van broedvogels geen sprake zijn.

Gedurende ruim tien jaar waarneming heb ik slechts één vogel een poging tot broeden weten ondernemen. Toevallig dan toch een soort die als broedvogel voor ons land op zijn minst belangrijk is. Op 16 juni 1954 zijn er op het onbegroeide gedeelte van het schiereilandje vier belegde nestkuiltjes gemaakt. 's Anderen-

daags zijn er zes kuiltjes en hevig alarmerende visdiefjes in de onmiddellijke omgeving. Andere waarnemers vertelden achteraf dat er ook een ei is geweest. Begrijpelijk is op dat drukke plaatsje dicht bij de huizen en onder het oog van zoveel nieuwsgierige en niet altijd vogelminnende lieden het feest niet doorgegaan. In het hiernavolgend avifaunistisch overzicht zal bijgevolg alleen worden gehandeld over de trekvogels, die vaak enkele dagen op de Spuikom pleisteren en over de wintervogels die vanzelfsprekend, zij het in wisselend aantal, langere tijd ter plaatse blijven.

### Parelduiker - *Gavia arctica*.

Onregelmatige doortrekker en wintergast. In totaal vier waarnemingen. Op 17.3.54 zijn er twee eks. die, in het geheel niet schuw, tot vlak bij de oever komen. Wij zien deze twee dagelijks terug tot en met 20 maart. Als gemiddelde duikduur noteren we 23 seconden.

### Roodkeelduiker - *Gavia stellata*.

Regelmatige wintergast in gering aantal. Minder op doortrek. Zes vogels op 18.2.50. Eén vogel in prachtkleed op 20.3.54. Laatste waarneming in het voorjaar op 3.4.54. Ook hier bedraagt de gemiddelde duikduur 23 seconden.

### Fuut - *Podiceps cristatus*.

Regelmatige doortrekker en wintergast, zelfs in losse groepen van 10 tot 15 vogels (maart 1950), van 12 tot 20 vogels (januari 1951 en januari 1955). De laatste mag men in april verwachten en zo genieten wij op 14.4.54 van het paarspel van een koppel volledig in prachtkleed gestoken futen. Deze paarspelen kan men ook al vroeger waarnemen, zoals op 23 maart 1954, met het bekende beeld van de gestrekte, tegen elkaar gebrachte halzen. Wij zagen dezelfde vogel achtereen-

volgens 25 en 25 seconden duiken met visje als prooi, 29 en 36 seconden met paling als prooi, die daarna geheel werd ingeslikt. Dit hele tafereel binnen de vijf minuten.

Roodhalsfuut - *Podiceps griseigena*.

Onregelmatige doortrekker. Slechts twee waarnemingen: 5 eks. op 11 sept. 1951 en één vogel op 1 jan. 1961. Gemiddelde duikduur, genoteerd bij deze laatste vogel, 27 seconden.

Kuifduiker - *Podiceps auritus*.

Onregelmatige doortrekker en wintergast. Een vogel op 14 maart 1956, nadat gedurende de strenge koude van 31 januari tot 27 februari een kuifduiker op het ijsvrije handelsdok in de Oostendse haven heeft verbleven. Weer één eks. op 18 februari 1958.

Geeuwde fuut - *Podiceps caspicus*.

Regelmatige doortrekker en wintergast, echter zelden in groot aantal (7 eks. op 29 nov. 1959) noch in groepsverband voorkomend (groep van 8 eks. op 30.10.61). Waarnemingen vanaf de tweede helft van augustus tot het einde van maart. Op 26 januari 1954 noteren we een eks. in een wak bij strenge vorst en op 26 maart twee vogels in prachtkleed.

Dodaars - *Podiceps ruficollis*.

Zeer algemene doortrekker en wintergast, soms in grote aantallen van 60 tot 80 vogels. Ook bij vorst blijven ze ter plaatse, totdat de kom vrijwel geheel is dichtgevroren. De vroegste trekkers zien we op 20 juli 1959 terwijl tot in de tweede helft van april enkele vogels kunnen worden opgemerkt.

Vaal stormvogeltje - *Oceanodroma leucorhoa*.

Onregelmatige gast. Eén vogel op 9 no-

vember 1952 na zware noordwesterstorm. Dezelfde dag zien we 10 exemplaren op verschillende plaatsen boven het strand.

Aalscholver - *Phalacrocorax carbo*

Algemene zomergast. Waarschijnlijk regelmatige doortrekker, maar onregelmatige wintergast. De aalscholvers die gedurende de voortplantingstijd dagelijks op de Spuikom te zien zijn, horen thuis in de broedkolonie bij Wulveringen, in vogelvlucht circa 25 km zuidwestwaarts. In 1955 is deze vestiging opgegeven en hebben de vogels zich verplaatst naar het veel dichterbijgelegen Westkerke, waar ze zijn gaan nestelen in de reigerkolonie. Deze verlegging van het broedterritorium heeft geen merkbare invloed gehad op het aantal aanwezige aalscholvers op de Spuikom.

Op 29 mei 1954 bevinden zich 54 vogels op de plas. Doordat de voor- en naajaarstrek grotendeels samenvalt met de reeds aanwezige broedvogels van Wulveringen (later Westkerke), is het moeilijk uit te maken in welke mate de aalscholver op de Spuikom als doortrekker voorkomt.

Na de broedtijd worden vooral veel juveniele vogels gezien. Wintervogels zijn er weinig; wij noteren slechts op 8 jan. 1954 één eks. Als enorme visverslinder, zijn voedsel bestaat hoofdzakelijk uit paling (vandaar aal-scholver), geniet hij bij de belanghebbenden van de streek een weinig goede faam.

Lepelaar - *Platalea leucorodia*.

Vooraf in de eerste helft van september trekken geregeld lepelaars langs het strand. Op 5.9.51 is er één eks. op de Spuikom (R. Van Outryve).

Wilde eend - *Anas platyrhynchos*.

Algemene doortrekker en regelmatige wintergast. Bovendien komen in maart

en vooral in april de woerden van de broedende wilde eenden uit de nabijgelegen polders vaak op de Spuikom bijeen.

Wintertaling - *Anas crecca*.

Onregelmatige doortrekker en wintergast. De wintertaling is een vogel die van ondiepe plassen houdt met veel beschermende vegetatie. Dit laatste ontbreekt hier helemaal. Als hoogste aantal noteren we een groepje van 12 vogels op 6.1.59.

Zomertaling - *Anas querquedula*.

Onregelmatige doortrekker. Hij is iets algemener in het voorjaar, maar het betreft dan dikwijls vogels die in de omgeving broeden.

Smient - *Anas penelope*.

Regelmatige doortrekker en wintergast. Zowel op trek als in de winter gaat het om troepjes van hoogstens 20 vogels. Als trekvogel wordt de smient hoofdzakelijk in het voorjaar, tot de tweede helft van april waargenomen.

Pijlstaart - *Anas acuta*.

Regelmatige doortrekker, hoofdzakelijk in het voorjaar. De pijlstaart komt minder algemeen, maar in grotere groepen voor dan de smient. Zelfs op voorjaarstrek blijven bepaalde vogelsoorten dikwijls verscheidene dagen ter plaatse. Dit konden we ondermeer bij de pijlstaart vaststellen: een groep van 26 vogels verblijft op de Spuikom van 27.3.56 tot 31.3.56; een andere groep van 32 vogels pleistert van 4.4.56 tot 6.4.56. Geen winterwaarnemingen.

Slobeend - *Spatula clypeata*.

Algemene doortrekker, maar vrijwel uitsluitend in het voorjaar. Groepen van 50 tot 70 vogels zijn dan niet zeldzaam.

Opvallend is daarbij dat deze gezelschappen soms een duidelijk overwicht aan woerden bevatten. Ook voor deze soort geen winterwaarnemingen.

Tafeleend - *Aythya ferina*.

Onregelmatige doortrekker en wintergast. Slechts 2 waarnemingen: 14 vogels op 17.12.53 en 2 vogels op 7.4.58.

Kuifeend - *Aythya fuligula*.

Regelmatige doortrekker en wintergast. De soort verschijnt meestal in troepjes van een tiental vogels en wordt als trekker veel meer in het voorjaar gezien dan in het najaar.

Toppereend - *Aythya marila*.

Onregelmatige doortrekker en wintergast. Wij bezitten slechts een vijftal waarnemingen, drie daarvan gaan om één exemplaar.

Brilduiker - *Bucephala clangula*.

Algemene doortrekker en wintergast. De talrijkste groep zien we op 4.1.58 bij zacht winterweer, namelijk 33 vogels waaronder 3 volwassen mannetjes. Als gemiddelde duikduur noteerden we ruim 20 seconden.

Ijseend - *Clangula hyemalis*.

Onregelmatige wintergast. Wij bezitten twee waarnemingen: een vogel op 4.1.58, die tot 18 januari ter plaatse blijft en een vogel op 28.12.58. De ijseend duikt veelvuldig, maar de duiktijden zijn van korte duur: ongeveer 15 seconden. Een bovengemaalde paling wordt onmiddellijk door een aanvallende kokmeeuw afhandig gemaakt.

Grote zeeëend - *Melanitta fusca*.

Onregelmatige wintergast. Een ♀ op 28.1.56 vlak voor aanvang van de strenge vorstperiode. Na twee weken vorst verschijnen vele honderden grote zeeëen-



den op zee en in het havengebied. Vele daarvan blijven nog lange tijd na de dooi ter plaatse, zelfs tot begin mei. Toch wrauen gedurende deze periode geen grote zeeëenden meer op de Spuikom gezien.

*Zwarte zeeëend - Melanitta nigra.*

Regelmatige wintergast. Talrijke groepen konden wij echter nooit waarnemen. Zeer vaak betreft het zelfs enkelingen en aangezien de zwarte zeeëend een vooraanstaande plaats inneemt onder de stookolieslachtoffers, moet er rekening mee worden gehouden, dat het in veel gevallen om aangetaste vogels gaat, die op het rustiger water van de Spuikom een laatste onderkomen zoeken.

*Eidereend - Somateria mollissima.*

Onregelmatige doortrekker. Wij bezitten twee waarnemingen die vooral van belang zijn omwille van de data: drie vogels op 10.4.55 die ter plaatse blijven tot 16 april en één vrouwelijke of juveniele vogel op 29.8.55, die dicht bij de oever uitsluitend krabben opduikt.

*Middelste zaagbek - Mergus serrator.*

Regelmatige wintergast, vooral na enige vorst van betekenis. In dit geval zijn de ♂♂ flink vertegenwoordigd. Ook voorjaarsbezoeken van kleinere groepjes of van enkelingen.

*Nonneijde - Mergus albellus.*

Onregelmatige wintergast. Alleen enkele waarnemingen in maart 1956 na de strenge vorstperiode en enkelingen in de winter van 52, 54, 59 en 60.

*Bergeend - Tadorna tadorna.*

Regelmatige doortrekker en wintergast. Vroegste waarneming: 7.8.51. Laatste waarneming: 11.4.56. Nooit echter komt de vogel in groot aantal voor.

*Knobbelzwaan - Cygnus olor.*

Onregelmatige gast. Na de strenge winter van 1956 zijn er op 3 april tien eks.; de volgende dag is nog één vogel te zien.

*Meerkoet - Fulica atra.*

Zeer algemene doortrekker en wintergast. De eerste vogels komen soms al tegen het eind van juli, terwijl andere tot laat in het voorjaar op de Spuikom verblijven. Op 18.6.54 nog drie eks.

Bij zacht winterweer zijn er gemiddeld een 500 meerkoeten, dit aantal verdubbelt bij vorstinvall. Hoogste aantal: 1221 op 19 januari 1954. Na de strenge winterkoude van 1956, die zoveel slachtoffers maakte, zijn de aantallen opvallend kleiner.

*Scholekster - Haematopus ostralegus.*

Regelmatige doortrekker. Op 17.3.56 staat op het kleine slikstrandje een groep van 31 scholeksters. Iets talrijker zijn ze nog wanneer per uitzondering gedurende de trektijd het terrein wordt drooggelegd.

De scholekster komt ook in mindere mate als wintergast voor: 10 eks. op het ijs op 1.2.56.

*Kievit - Vanellus vanellus.*

Onregelmatige doortrekker, doordat hij slechts uitzonderlijk op het schiereilandje neerstrijkt.

*Bontbekpluvier - Charadrius hiaticula.*

Algemene doortrekker. Bij eventuele drooglegging vaak in groot aantal: 241 bontbekjes op 17.3.56. Wij hebben slechts één winterwaarneming: 3 eks. op 5.1.54.

*Kleine pluvier - Charadrius dubius.*

Onregelmatige doortrekker. Broedt in de onmiddellijke omgeving, zodat de soort ook in de zomermaanden in het gebied wordt waargenomen.

Strandpluvier - *Charadrius alexandrinus*.

Algemene doortrekker. Vroegste voorjaarswaarneming: 3 eks. op 26.3.54. Merkwaardig is hier vooral de winterwaarneming op 29.12.55. Aangezien de soort tot voor enkele jaren in de omgeving broedde, waren zomerwaarnemingen op het slikstrandje niet uitzonderlijk.

Zilverpluvier - *Charadrius squatarola*.

Regelmatige doortrekker, doch steeds in klein aantal op het slikstrandje te zien. Voorjaarstrek in prachtkleed tot half-mei.

Steenloper - *Arenaria interpres*.

Regelmatige doortrekker en wintergast. Waarnemingen vanaf half juli. De steenlopers die 's winters normaal op de golfbrekers langs het zeestrand vertoeven, komen bij hoogtij of ongunstig weer wel eens naar de Spuikom. Aldus noteren we 62 steenlopers op 29.12.55 bij storm op zee.

Watersnip - *Gallinago gallinago*.

Regelmatige doortrekker in klein aantal; verblijft dan steeds tussen de dichte vegetatie van het schiereilandje.

Bokje - *Lymnocyptes minimus*.

Onregelmatige doortrekker. Eén eks. opgesloten op 14.10.53.

Wulp - *Numenius arquata*.

Regelmatige doortrekker en wintergast in klein aantal. Talrijker wanneer het terrein is drooggelegd.

Regenwulp - *Numenius phaeopus*.

Regelmatige doortrekker in het najaar (vooral augustus), maar eveneens in klein aantal, doordat slechts weinige vogels op het kleine slikstrandje neerstrijken.

Grutto - *Limosa limosa*.

Onregelmatige doortrekker. Alhoewel hoofdzakelijk zoetwatervogel bevinden er zich 2 eks. op het slikstrandje op 2.4.53.

Rosse grutto - *Limosa lapponica*.

Regelmatige doortrekker, in het voorjaar (vooral eind april) in prachtkleed.

Witgatje - *Tringa ochropus*.

Onregelmatige doortrekker. Enkele nazomerwaarnemingen steeds bij het minime brakwaterpoeltje op het schiereiland.

Bosruiter - *Tringa glareola*.

Onregelmatige doortrekker, weer uitsluitend in de nazomer op het schiereilandje.

Oeverloper - *Tringa hypoleucos*.

Algemene doortrekker, in het najaar vanaf half juni, in het voorjaar tot half mei. Wordt veel gezien op de stenen glooiing die de Spuikom omgeeft. Een dertigtal oeverlopers op 29.8.51.

Tureluur - *Tringa totanus*.

Algemene doortrekker en regelmatige wintergast. Bij drooglegging vaak in groot aantal.

Zwarte ruiter - *Tringa erythropus*.

Onregelmatige doortrekker. Twee septemberwaarnemingen op het slikstrandje.

Groenpootruiter - *Tringa nebularia*.

Regelmatige doortrekker zowel in voor- als najaar, maar nooit in groot aantal.

Kanoeistrandloper - *Calidris canutus*.

Regelmatige doortrekker. Merkwaardig

zijn vooral een eks. op 21.2.55 en een late voorjaarsstrekker op 2.6.54.

Paarse strandloper - *Calidris maritima*.

Onregelmatige wintergast. Slechts één waarneming : 11 vogels in het gezelschap van 50 steenlopers bij drooglegging van het terrein op 14.1.56.

Kleine strandloper - *Calidris minuta*.

Onregelmatige doortrekker. In totaal 6 waarnemingen. Op 11.10.53 een groepje van zes op het slikstrandje, dat ter plaatse blijft tot en met 14 oktober. Op 29.5.54 nog een vogel in prachikleed.

Bonte strandloper - *Calidris alpina*.

Algemene doortrekker en onregelmatige wintergast. Bij drooglegging soms in groot tot zeer groot aantal.

Drieteenstrandloper - *Crocethia alba*.

Onregelmatige doortrekker en wintergast. Eén eks. op 14.8.50 en vijf eks. op 29.12.55 bij storm op zee.

Kemphaan - *Philomachus pugnax*.

Onregelmatige doortrekker. Slechts één wintervogel, namelijk op 19.1.54.

Klaau - *Recurvirostra avosetta*.

Onregelmatige doortrekker, vooral in het voorjaar en in klein aantal.

Mantelmeeuw - *Larus marinus*.

Zilvermeeuw - *Larus argentatus*.

Kleine zeemeeuw - *Larus canus*.

Kokmeeuw - *Larus ridibundus*.

Deze vier meeuwensoorten zijn algemeen doortrekker en wintergast, terwijl niet-geslachtsrijpe vogels ook overzomeren. In voor- en najaar zijn vaak een tweeduizendtal meeuwen te zien op de Spuikom, die bovendien een belangrijke slaapplek voor deze vogels is. Al deze meeuwen hebben de gewoonte de opgedoken buit van eenden, futen en duikers afhandig te maken.



Zilvermeeuw.

Foto : N. Gerard.

Kleine mantelmeeuw - *Larus fuscus*.

Algemene doortrekker. Vooral talrijk in augustus en september. Iets minder algemeen in het voorjaar.

Dwergmeeuw - *Larus minutus*.

Regelmatig doortrekker in de nazomer, veel minder in het voorjaar. De eerste vogels komen al in juli: 80 eks. op 23.7.50. Maar verreweg de meeste dwergmeeuwen trekken door in augustus en begin september.

Zwarte stern - *Chlidonias niger*.

Regelmatige doortrekker, vooral in het najaar en in klein aantal. De eerste vogels verschijnen in juli, de meeste waarnemingen vallen evenwel in de tweede helft van augustus en in de eerste helft van september. Dezelfde exemplaren blijven dan vaak meerdere dagen ter plaatse.

Visdiefje - *Sterna hirundo*.

Algemene doortrekker, dikwijls in groot aantal. Op 14.7.51 zijn er reeds meer dan honderd visdiefjes op het slikstrandje. De terugtrek duurt tot einde mei. Een late waarneming van 1 eks. deden we op 30.10.61. Zie ook inleiding in verband met de broedpoging van juni 1954.

Noordse stern - *Sterna macrura*.

Regelmatige doortrekker, in de nazomer vooral in augustus en tot einde mei in het voorjaar.

Dwergstern - *Sterna albifrons*.

Regelmatige doortrekker, in het najaar vanaf half juli. Nog twee vogels op 18.6.54.

Grote stern - *Sterna sandvicensis*.

Regelmatige doortrekker. De meeste waarnemingen in augustus.

Zeekoet - *Uria aalge*.

Onregelmatige wintergast. Slechts 3 waarnemingen, terwijl het hoogste aantal vogels 2 bedraagt op 3.1.60. De zeekoet is een vogel van de open zee, die slechts uitzonderlijk in de nabijheid van de kust verschijnt. Hier moet dan ook rekening worden gehouden met stookolieslachtoffers.

Ijsvogel - *Alcedo atthis*.

Vrij regelmatige doortrekker. Veel ijsvogels worden er geschoten.

### III. Besluit.

Dit zijn de 68 soorten watervogels die wij op de Spuikom hebben waargenomen. Afgezien van enkele zeer gewone en ook wel minder algemene zangvogelsoorten als sneeuwgorst, ijsgorst, fratertje en oeverpieper, mag deze lijst als een vrijwel volledige avifauna van de Spuikom worden aangezien.

Er zijn geen broedvogels en alhoewel blijkt dat noch de soortenrijkdom noch de getalsterkte van de verschillende soorten opvallend groot is, toch mag met voldoening worden gezegd dat, wegens het apart karakter van het gebied, de Spuikom een zeer specifieke vogelbevolking herbergt. Er zijn plannen voor de aanleg van een watersportbaan; dit zal het vogelleven in de zomermaanden bedreigen. Toch blijven wij vol goede hoop dat ook in de toekomst een bezoek aan de Spuikom in de beide trektijden en in de winter steeds weer de moeite zal lonen.

Westmalle, december 1961.